



## Conseils aux patients recevant une couronne sur implant

### Après la visite d'empreinte :

1. Si le dentiste a procédé sous anesthésie, évitez de manger quoi que ce soit tant que les effets de l'anesthésie ne seront pas disparus.
2. Prenez la médication suggérée la journée de la procédure.
3. Il est possible que la gencive soit sensible ou gonflée ou qu'elle saigne suite à l'empreinte réalisée par le dentiste. Si tel est le cas, nous vous recommandons de vous gargariser avec un bain de bouche à base d'eau et de sel ou le bain de bouche *Peroxyl de Colgate*. Répétez pour quelques jours, 2-3 fois/jour.

### Après la cimentation de la couronne finale :

1. Évitez de manger quoi que ce soit tant que les effets de l'anesthésie ne seront pas disparus. S'il n'y a pas eu d'anesthésie, nous vous demandons d'attendre 1h avant de manger, afin de laisser sécher le ciment.
2. Vous pouvez brosser normalement et passer la soie dentaire sans problème et ce, dès la première journée.
3. Si vous ressentez un inconfort, ou si la dent vous paraît trop longue, communiquez avec la clinique. Nous procéderons à un ajustement d'occlusion.
4. Pour toute autre question ou problème, n'hésitez pas à appeler à la clinique.